24. aout 1760. Observation n.° 154.

Hydro-Sarcocelle Carcinomateux; Extirpé avec Succes

Par Mr. Lante Chirurgien Major d'un Battⁿ au Regiment des Gardes Walonn., Et Correspondant de L'accademie Royale de Chirurgie de Paris.

Le Nommé Limousin soldat au Regimᵗ. des Gardes Walonnes, dans la Compᵉ. de Duumet, agé de 32 ans, et dune Consti=tution robuste; fut attaqué il y aura Environ dix mois apres un acces de vin, D'un gonflement inflamatoire dans tout L'escrotum; Le Chirurgien qui fut appellé Calma L'inflamation par les Remedes appropriés, et apres d'autres differents Remedes on S'apperçut d'un hydrocele au Cotté Gauche du scrotum, pour le quel on fit la ponction, et le malade continua a faire son service: cependant il falut Reiterer cette operation pendant trois fois dans L'espace de Six mois; il est vrai qu'a la Seconde on S'aperçut que

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 25 d. 1

le Testicule gauche etoit gros, et dou=
loureux.
Enfin comme la douleur du testicule —
augmenta considerablement au point
d'empecher se soldt. de faire son service,
il fut mis à mes soins pour tacher de
le guerir radicalement.

L'ayant donc visitté pour la premiere
fois il y aura environ deux mois, je lui
trouva le testicule gauche carcinomateux
d'une grosseur considerable, acompagné —
D'hydrocelle, le tout fort douleureux ce
qui l'Empechoit absolument de pouvoir
marcher, malgré son suspensoir

Apres avoir questioné mon malade, il
me dit quil avoit eut differents maux
veneriens, qu'en Consequence avoit passé
deux fois par les Remedes, et la derniere
fois, depuis qu'il etoit attaqué de son —
incomodité, ce qui ne lui avoit procuré
aucun soulagement.

J'examina s'il pouvoit y avoir quelque
vice Ecrouelleux, ce qu'il m'a paru en
avoir été exempt, au moins n'en à
pas paru des marques.

Ayant fait aßembler mes confreres pour Délibérer au sujet de son traittement, il fut resolu d'une voix unanime qu'on ne pouvoit le guerir que par l'operation; ce qui nous fit faire un pronostic favorable, et que l'operation reußiroit; fut que nous trouvames le Cordon sper=matique fort sain et point gonflé, il est vrai que le malade avoit toujours eut Grand soin de porter un suspensoir.

Cependant les sentiments furent partagés sur la methode de faire l'operation, les uns vouloient faire la Castration par la methode ordinaire, comme Conseillent Messrs. Ledran, garengeot, heister, de la faye &a. et les autres vouloient attaquer la tumeur par les caustiques.

Neanmoins pour Consilier les differents sentiments, voici comme je procedai pour emporter cette tumeur; apres avoir preparé le malade par les remedes generaux, japliqua une trainée de pierres a Cautere a la partie laterale gauche du scrotum, ayant premierement apliqué un emplatre fennetré d'une

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

figure ovale, non pas dans la vüe
D'attaquer la tumeur par le caustique;
mais bien pour m'approcher de la
Methode Mr. sharp (a) qui est de faire
une playe ovalaire a L'escrotum, et
pouvoir par la emporter la tumeur
avec plus de facilité, ce que je fis cinq
jours apres, tems auquel les escarres
etant tombées, me Laisserent une playe
de quatre bons pouces de longueur, et
D'une figure ovalaire, ce qui me laissa
une grande partie de la tumeur a
Decouvert.

Cette playe laissa ecouler une grande
quantité d'Eau, la quelle etoit contenue
sous la tunique vaginale, ce qui
formoit L'idrocele dont jais fait men=
tion plus haut. pour finir donc mon
operation, je fendis le scrotum depuis
La playe jusqu'a l'aine, et disequai le
Cordon Spermatique, apres quoy je le
fis serrer entre deux doigts par un
aide Chirurgien, ayant passé aupara=
vant un fil pour le lier en Cas de
Besoin.

(a) voy. Recher. crit. Sur letat present de la Chirurg. pag. 124 et
suivant.

Pendant que cet aide tenoit Comprimé
Le Cordon avec le pouce et L'index de sa
main droite, je Coupai avec le bistouri
Le dit Cordon, et je dissequa la tumeur
de haut en bas, non pas sans dificulté
puisqu'elle montoit fort haut par
raport a L'epidime qui etoit aussi fort
gonflé et squirreux, et le Corps de la
tumeur etant appuyée contre l'uretre,
ce qui me fit travailler avec beaucoup de
Circonspection de Crainte d'ouvrir le
Canal

Enfin la tumeur étant emportée, il ne
me falut point toucher du scrotum,
puisque le Caustique avoit fait ce
qu'auroit fait L'instrument tranchant,
en suivant exactement la methode de
Mr. Sharp.

L'artere de la Cloison donna fort peu
de Sang, il y eut Lespermatique qui
dardoit Beaucoup, ce qui me fit avoir
recours à L'agaric (sans me servir du
fil que j'avois pris La precaution de
passer sur le Cordon) moyenant une
petite Compression, et un Bandage

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Convenable le sang fut arreté avec aßez de faßilité

Le blessé fut mis a une diette Convenable, et saigné deux fois pendant les 24 heures: j'avoir soin de faire arroser L'apareil avec une decotion vulneraire, a la quelle on ajoutoit un peu d'eau de vie Camphrée.

Le Lendemain de L'operation le Blessé avoit Beaucoup de fievre, et avoit passé une mauvaise nuit: ce meme jour il prit un lavement il fut saigné une troisieme fois, et le soir prit un julep Calmant. Comme la fievre Continuoit le 3.me jour avec douleur a L'aine gauche, accident qui me faisoit Craindre L'inflamation Le long du Cordon, cela me porta a faire Reiterer la saignée, le lavement, et lui prescrire une tisane tamparente, avec le Kina deux fois par jours.

Le 4.me jour on otta L'appareil, et on vit un Commencement de Supuration: comme les bords de La playe avoit été bien joints

Suivant.

au Premier appareil, nous les rencontrames assez raprochés ayant La figure d'un triangle irregulier.

Enfin le 5.me jour le malade fut sans fievre, et moyenant un pensement methodique la playe fut Cicatricée en 20 jours de tems

La Tumeur ayant été examinée a Loisir, elle etoit d'un volume plus gros que les deux poingts; étant formé par le testicule Confondu avec ses membranes, et L'epididime, le tout presentant des eminences, ou protuberances de Couleur Livide, et tres dures, nous trouvâmes dans le propre Corps du testicule un vuide a pouvoir contenir une noix. remplit d'une matiere grumeleuse de Couleur blanchatre.

Neanmoins quoy que la methode que j'ai suivie pour ce malade aye Reussi, on doit preferer celle de mr. Sharp voy: loc. cit., bien entendu q'au lieu de Ligature au Cordon on se serve de L'agaric.

Barcelone ce 29 fevrier 1760

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE